Sur une Luxation du famur ant.ere et supr.e

du Mois de Juin 1739

n.° 39.

En 1739 au Mois de Juin, L'on Pria Monsr. Boudou, de passer en la salle St nicolas, pour y Voir une femme agée d'Environ Cinquante Cinq ans, qui etoit tombée sur ses genoux, etant Chargée d'un Fardeau fort pesant, qu'elle portoit dans une hotte sur son Dos.

Une douleur tres vive qu'elle resentoit dans L'aine, et dans la partie posterieure de la Cuisse du meme Coté, L'impuissance, et L'Engourdissement de cette meme partie, Jointe au Viçe de Conformation suivant sa Longeur, et qui n'etoit pas naturel, donnerent Lieu de Croire qu'il y avoit Luxation, et En efet Monsr Boudou L'ayant examinée, trouva que la teste de L'os etoit située sur la partie anterieure et superieure du pubis, ou elle formoit une tumeur Considerable, ce qui Constatoit cette Espeçe de Luxation si rare, que l'on Nomme anterieure et superieure.

Surpris d'un pareil incident, qui metoit la Malade dans un danger Evident, tant par la Compression que La teste de L'os faisoit a L'artere, et Veine Crurale, etant passée dessous, que par La distension qu'elle Causoit aux fibres tendineuses, aponevrotiques, et ligamenteuses. il travailla sur le Champs a y remedier, et reduisir parfaitement bien cette partie par les seuls Lacs, quoique

ARC41
n° 34

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

Quoique plusieurs avant Lui, ce fussent Servi de ce Moyen, et mesme de plusrs. autres sans — Succes.
Apres cette operation, l'on appliqua sur la partie une Embrocation d'huile rosat, une Emplastre de cerat, et le Bandage propre pr. cette Maladie. au bout de huit Jour la Malade fut en etat de se Lever, et Sortir peu de temps apres de la ditte Maison parfaittement bien guerie, et se servant de sa Cuisse avec autant de force, — d'agilité, et de souplesse, qu'auparavant.

A quel Danger n'étoit pas Exposé cette femme si l'on ne luy eut donné un prompst Secours? la Compression que la teste de L'os faisoit aux gros vaissx. etoit Seule Capable d'ocationer ~~et~~ la gangrenne, en interceptant Le Mouvement des Liqueurs, et Le tiraillement que Souffroient Les fibres tendineuses ~~es~~, et ligamenteuses ~~es~~, auroit été Suivie ~~s~~ d'Engorgement dans ces memes — parties, d'inflammation, d'abces, et peut etre mesme de gangrenne. Mais En reduisant ces os, la tention des fibres a cessée, le Mouvement progressif des Liqueurs c'est retabli, Enfin par Les Saignées, Le repos, et un bon Regime de Vivre, elle s'est trouvée guerie En peu de temps, au grand etonnement de tous ceux qui avoient

Connoissance de cette Maladie. Ceux des aulheurs qui en font mention, Laregarde Comme une des plus rares, et des plus facheuses. Peu nous asseurent En avoir Veüe, et ilniena pas qui nous disent En avoir reduit, ni veue querir.

detout ceci nous devons conclure, quil peut arriver des Luxations même des plus Complettes Delapartie Superieure du femur, sans que Lateste de cet os soit fracturée, nises Ligaments dechirées puisque L'on voit par cette observation Combien ils sont Capables de pretter dans de semblables Cas. Car asseurement sila fracture deLos, ou La Rupture des Ligaments Eussent accompagnées cette Luxation, Certainement Lamaladie n'auroit pas été querie Ensipeu detemps.

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

n.° 39.